

Läkemedelsinformation

Tar du något av dessa läkemedel?

Waran, Apekumarol, Warfarin	<i>Då ska du senaste 7 dagar före undersökningen kontakta din AK-mottagning/behandlande läkare för utsättande av läkemedlet.</i>
Brilique, Clopidogrel, Cloriocard, Efient, Gripid, Plavix Ticlid	<i>Senaste 7 dagar före undersökningen bör du göra uppehåll med läkemedlet. OBS - Kontakta din behandlande läkare om du haft hjärtinfarkt/stroke eller genomgått kranskärlsröntgen med ballongsprängning de senaste 12 månader alternativt haft en blodpropp de senaste 3 månaderna. Då ska du inte göra uppehåll av läkemedlet innan din läkare godkänt detta.</i>
Eliquis, Lixiana, Pradaxa Xarelto	<i>Då ska du 1 dag före undersökningen göra uppehåll med läkemedlet inför undersökningen.</i>
Acetylsalisylsyra, Fragmin, Innohep, Klexane Trombyl	<i>Då ska du inte ta läkemedlet samma dag som du gör undersökningen</i>
Bulkmedel	<i>Sluta med Lunelax, Metamucil, Vi-Siblin, Inolaxol och Laktulos 7 dagar innan undersökningen (gäller endast koloskopi). Du kan i stället använda Dulcolax, 2 tabletter dagligen 5 dagar innan undersökningen, alternativt Movicol.</i>
Järnmedicin	<i>Sluta ta järnmedicin 7 dagar före undersökningen (gäller endast koloskopi)</i>
Diabetesmedicin	<i>Du ska själv ta kontakt med din läkare eller diabetessjuksköterska för dosjustering av medicin inför förberedelserna och undersökningen. Håll noggrann uppsikt över din blodsockernivå.</i>
Övriga läkemedel	<i>Övriga läkemedel ska du ta som vanligt fram till och på undersökningsdagen. OBS - Minst 2 timmar före undersökningen får du ta dina läkemedel.</i>

